



V Jornada Mejora de la Seguridad del Paciente en Atención Primaria

Formulario Comunicaciones

Toledo , 13 de Abril de 2012

En virtud de la Ley Orgánica 15/199, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán tratados por **Azul Congresos** con el fin de tramitar su inscripción. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose al responsable del fichero.

018	alroma1.doc	TITULO
Número de registro (secretaría técnica)	Identificación del fichero (aabbccn.doc)	PROTOCOLO SISTEMA PERSONIFICADO DE DOSIFICACIÓN
Marife Alvarez Rodríguez M Mercedes Escudero Hernández		
Autores		
Marife Alvarez Rodríguez		
Autor para contactar		
Dirección postal para contactar		
Correo electrónico	Teléfono	Fax

Resumen [Objetivo / Metodología / Resultados / Conclusiones] Máx.: 300 car.

JUSTIFICACION

El envejecimiento de la población y la pluripatología son factores implicados en la polimedicación, causa directa de mala adherencia al tratamiento.

Los sistemas personalizados de dosificación (SPD) reducen los errores en la toma de medicamentos, evitan problemas de manipulación, reduce el stock almacenado en el domicilio y evita problemas de confusión y/o intoxicación involuntaria.

SPD: Son unos dispositivos tipo blister, consta de una serie de alvéolos etiquetados con los días de la semana y las diferentes horas de administración de medicamentos, según pauta terapéutica prescrita.

OBJETIVO

Mejorar cumplimiento del tratamiento farmacológico sin duplicidad de dosis ni olvidos.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

- Edad >75 años
- Polimedicación: 5 fármacos o más.
- Antecedentes de olvidos y/o sobredosificación
- Enfermedades crónicas: DM, HTA, DLP, EPOC, ICC, dolor crónico, patología psiquiátrica
- Deterioro cognitivo leve-moderado (Pfeiffer y/o Miniexamen Cognoscitivo Lobo)
- Aislamiento social.

INTERVENCIÓN

- Detección en consulta de enfermería, verificando que cumple criterios de inclusión.
- Informar al paciente (y/o familia) de la posibilidad de utilizar SPD.
- Revisión del tratamiento terapéutico activo para descartar incidencias y si es posible reducción del número de dosis.
- Facilitar listado de farmacias próximas a su domicilio que preparen SPD
- Visita para comprobar el manejo del SPD y control en 4, 8 y 12 semanas para valorar cumplimiento (Morisky-Green), siguientes visitas semestrales.

INDICADORES DE MEDIDA

Morisky-Green y recuento de comprimidos en SPD en cada visita de seguimiento.

Si se detecta mal cumplimiento: intentar tutorización por un familiar (si es posible), adelantar visita y reforzar educación sanitaria.

Profesionales en formación : -----

Presentación : Oral breve

Línea temática : Buenas Prácticas en Seguridad del Paciente.



Secretaría técnica

AZUL Congresos

C/ Uría 68, 1º D. 33003 Oviedo, Asturias. T 984.051.671 / 984.051.604. F 984.281.671
seguridadpaciente@azulcongresos.com