



# V Jornada Mejora de la Seguridad del Paciente en Atención Primaria

## Formulario Comunicaciones

Toledo , 13 de Abril de 2012

En virtud de la Ley Orgánica 15/199, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán tratados por **Azul Congressos** con el fin de tramitar su inscripción. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose al responsable del fichero.

070

Número de registro  
(secretaría técnica)

alferpau1.doc

Identificación del fichero  
(aabbccn.doc)

**TITULO**

ESTRATEGIA PARA LA REVISIÓN DE LOS PACIENTES TRATADOS CON  
BISFOSFONATOS A LARGO PLAZO

PAULA ÁLVAREZ FERNAUD  
JUANA OBREO PINTOS  
GEMMA PRIETO DE LAMO

Autores

PAULA ÁLVAREZ FERNAUD

Autor para contactar

Dirección postal para contactar

Correo electrónico

Teléfono

Fax

### Resumen [Objetivo / Metodología / Resultados / Conclusiones] Máx.: 300 car.

En Abril de 2011, la Agencia Española del Medicamento publicó una alerta relativa a la asociación entre el uso de bisfosfonatos (BF) durante 5 o más años de tratamiento y el incremento de fracturas atípicas femorales.

Objetivos:

- 1- Valorar el impacto de la comunicación de los pacientes afectados por la alerta a los facultativos en la retirada del BF.
- 2- Analizar la adecuación del tratamiento para la osteoporosis según el protocolo elaborado por la Subcomisión de Uso Racional del Medicamento del Área.

Metodología

Diseño: Estudio cuasiexperimental antes-después en un Área de Salud.

Población de estudio: médicos de Atención Primaria (AP) con pacientes en tratamiento con BF  $\geq 5$  años detectados a través del sistema de facturación de recetas.

Intervención: envío de una encuesta dirigida a los facultativos en la que se comunicaban los pacientes objeto de estudio y se especificaban las siguientes variables: edad, sexo, retirada del BF\* (SI/NO) e indicaciones de uso.

\*Mediante: encuesta y base de datos de facturación de recetas.

Resultados

N=130 facultativos. Tasa de respuesta 48,5% (63). Se encontraron 727 pacientes con BF  $\geq 5$  años. La edad media+DE fue de 75,6+8,6 y el 3,6% eran hombres. Según la encuesta se retiró el tratamiento a 202 pacientes (54%) y se comprobó que esta retirada había sido efectiva en 169 (45,2%).

Según la encuesta, de los 172 pacientes a los que no se retiró el tratamiento, 15 (8,7%) fueron derivados a especializada o se les solicitó una densitometría para valorar dicha retirada.

Adecuación del tratamiento según protocolo: 33,4% adecuado (80% prevención secundaria). 46% no adecuado y 20,3% no valorable por falta de datos.

Conclusiones

La comunicación a los facultativos de los pacientes susceptibles de tener problemas relacionados con el uso de BF motivó la retirada real de casi la mitad de los tratamientos.

Profesionales en formación : Otros Profesionales en Formación

Presentación : Indistinto

Línea temática : Seguridad del Paciente y uso de la medicación en A.P.



Secretaría técnica

AZUL Congressos

C/ Uría 68, 1º D. 33003 Oviedo, Asturias. T 984.051.671 / 984.051.604. F 984.281.671  
seguridadpaciente@azulcongresos.com